

还原型谷胱甘肽 (reduced glutathione, GSH) 试剂盒说明书

分光光度法 50 管/48 样

注意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

GSH 是细胞内最主要的抗氧化巯基物质，在抗氧化、蛋白质巯基保护和氨基酸跨膜运输等中具有重要作用。还原型与氧化型比值 (GSH/GSSG) 是细胞氧化还原状态的主要动态指标。因此，测定细胞内 GSH 和 GSSG 含量以及 GSH/GSSG 比值，能够很好地反映细胞所处的氧化还原状态。

测定原理：

DTNB 与 GSH 反应生成复合物，在 412nm 处有特征吸收峰；其吸光度与 GSH 含量成正比。

自备仪器和用品：

可见分光光度计、低温离心机、水浴锅、可调节移液器、1mL 玻璃比色皿和蒸馏水。

试剂组成和配制：

试剂一：液体×1 瓶，4℃保存。

试剂二：液体×1 瓶，4℃保存。

试剂三：液体×1 瓶，4℃避光保存。

粗酶液提取：

- 组织：按照组织质量 (g)：试剂一体积(mL)为 1: 5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 试剂一）进行冰浴匀浆。8000g, 4℃离心 10min，取上清置冰上待测。
- 细菌、真菌：按照细胞数量 (10⁴ 个)：试剂一体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 试剂一），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；然后 8000g, 4℃，离心 10min，取上清置于冰上待测。
- 血清等液体：直接测定。

GSH 测定操作：

- 分光光度计预热 30min，调节波长到 412 nm，蒸馏水调零。
- 试剂二置于 25℃（一般物种）或者 37℃（哺乳动物）水浴中保温 30min。
- 空白管：取 1mL 玻璃比色皿，依次加入 100μL 蒸馏水，700μL 试剂二，200μL 试剂三，混匀静置 2min 后测定 412 nm 吸光度 A1。
- 测定管：取 1mL 玻璃比色皿，依次加入 100μL 上清液，700μL 试剂二，200μL 试剂三，混匀静置 2min 后测定 412 nm 吸光度 A2。

注意：空白管只需要测定一次。

GSH 含量计算公式：

GSH 标准曲线公式：y=1.5 x (x 为 GSH 浓度, μ mol /mL; y 为吸光值)

GSH 计算:

(1) 按蛋白浓度计算

$$GSH (\mu \text{ mol}/\text{mg prot}) = (A_2 - A_1) \div 1.5 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) = 0.667 \times (A_2 - A_1) \div C_{\text{pr}}$$

(2) 按样本鲜重计算

$$GSH (\mu \text{ mol}/\text{g 鲜重}) = (A_2 - A_1) \div 1.5 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{总}} \times W) = 0.667 \times (A_2 - A_1) \div W$$

(3) 按细胞数量计算

$$GSH (\mu \text{ mol}/10^4 \text{ cell}) = (A_2 - A_1) \div 1.5 \times V_{\text{样}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{总}} \times \text{细胞数量}) = 0.667 \times (A_2 - A_1) \div \text{细胞数量}$$

(4) 按液体体积计算

$$GSH (\mu \text{ mol}/\text{mL}) = (A_2 - A_1) \div 1.5 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样}} = 0.667 \times (A_2 - A_1)$$

V_{样总}: 上清液总体积, 1 mL; V_样: 加入反应体系中上清液体积, 100 μL=0.1 mL; W: 样品质量, g;

C_{pr}: 上清液蛋白质浓度, mg/mL;

注意事项:

1. 试剂一中含有蛋白质沉淀剂, 因此上清液不能用于蛋白浓度测定。

2. 最低检出限为 0.01mmol/L。