

游离脂肪酸 (FFA) 含量试剂盒 (测血清、动物组织、微生物、细胞)

微量法 100 管/96 样

注 意: 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义:

游离脂肪酸，也称为非酯化脂肪酸，在与白蛋白结合的血浆中循环。动物血液中的游离脂肪酸 (FFA) 含量是一项重要的生理生化指标。血清中游离脂肪酸的浓度与脂类代谢、糖代谢、内分泌功能有关，游离脂肪酸的浓度会因为糖尿病、重症肝障碍、甲状腺功能亢进等疾病而上升。

测定原理:

用有机溶剂萃取 FFA。含有 FFA 的有机液与三乙醇胺铜反应，在有机相中形成脂肪酸铜 (铜皂) FFA — Cu²⁺。Cu 离子与显色液反应形成紫红色络合物。反应形成的颜色深浅与 Cu 离子浓度的关系符合朗伯—比尔定律，因此可利用此反应进行比色。

自备的仪器和用品:

酶标仪、离心机、可调式移液器、96 孔板、蒸馏水。

试剂的组成和配制:

萃取液：液体 120 mL×1 瓶，4℃保存；

试剂一：液体 15 mL×1 瓶，4℃保存；

试剂二：液体 15 mL×1 瓶，4℃保存；

试剂三：粉剂×1 瓶，室温保存；

试剂四：液体 12 mL×1 瓶，4℃保存；

样本前处理:

1. 动物组织：按照动物组织质量 (g) : 萃取液 mL) 为 1: 5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 萃取液），进行冰浴匀浆。震荡提取 15min，5000 rpm 4℃离心 5min，取有机相待测。

2. 血清：吸取 50 μL 血清样本，加入 1 mL 萃取液，震荡提取 15 min 后，4℃，5000 rpm 离心 5 min，取有机相待测。

3. 微生物、细胞：按照细胞数量 (10⁴ 个) : 萃取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例（建议 500 万细胞加入 1 mL 萃取液）加入萃取液，冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 2 秒，间隔 3 秒，总时间 3min）；震荡提取 15 min，然后 5000 rpm 4℃离心 5min，取有机相待测。

注意：有机相待测液可能存在于上层，也可能存在于下层，注意观察，体积较多的那一层即为有机相待测液。

测定步骤:

1、 酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 550 nm。

2、 工作液的配制：临用前根据用量按照试剂一 (V) : 试剂二 (V) : 试剂三 (m) =1 (mL) : 1 (mL) : 0.66 (g) 的比例充分混匀。（注意：现用现配，用多少配多少，在空瓶中配制，试剂盒中带有 4 个空瓶，先将试剂一与试剂二混合，最后再加入试剂三粉剂）

3、测定管：吸取600 μ L样本，加入200 μ L工作液，盖紧后震荡20 min, 4°C, 5000 rpm离心5 min, 分层后取200 μ L上层有机相，加入100 μ L试剂四，摇匀，10 min后测定550 nm的吸光值，记为A测定。

4、空白管：吸取600 μ L萃取液，加入200 μ L工作液，盖紧后震荡20 min, 4°C, 5000 rpm离心5 min, 分层后取200 μ L上层有机相，加入100 μ L试剂四，摇匀，10 min后测定550 nm的吸光值，记为A空白。

空白管只需测一次。 $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$

注意： 1、有机溶剂易挥发，加入96孔板后应尽快检测。

2、测定管中加入的样本即样本前处理中的有机相待测液。

FFA 含量计算：

标准曲线： $y = 0.0161x - 0.0141$ $R^2 = 0.9985$ x: 棕榈酸标准品浓度 (nmol/mL)
y: 吸光值差值 ΔA

1、血清 FFA 含量计算：

$$\begin{aligned} \text{FFA 含量} (\mu \text{mol/mL}) &= (\Delta A + 0.0141) \div 0.0161 \times V_1 \div (V_3 \times V_1 \div V_2) \div 1000 \\ &= 1.242 \times (\Delta A + 0.0141) \end{aligned}$$

2、动物组织、微生物、细胞中 FFA 含量计算：

(1) 按样本蛋白浓度计算

$$\begin{aligned} \text{FFA 含量} (\mu \text{mol/g 鲜重}) &= (\Delta A + 0.0141) \div 0.0161 \times V_1 \div (W \times V_1 \div V_2) \div 1000 \\ &= 0.062 \times (\Delta A + 0.0141) \div W \end{aligned}$$

(2) 按样本蛋白浓度计算

$$\begin{aligned} \text{FFA 含量} (\mu \text{mo/mg prot}) &= (\Delta A + 0.0141) \div 0.0161 \times V_1 \div (V_1 \times C_{\text{pr}}) \div 1000 \\ &= 0.062 \times (\Delta A + 0.0141) \div C_{\text{pr}} \end{aligned}$$

V1：加入样本体积，0.6mL；V2：萃取液体积，1mL；V3：加入血清（浆）体积，0.05 mL；Cpr：样本蛋白浓度，mg/mL；W：动物组织样品质量，g；1000：1 μ mol=1000 nmol。

注意事项：

1. 蛋白含量不可直接用萃取液提取的有机相待测液直接测定，可用蒸馏水或缓冲液或生理盐水选用本公司的 BCA 法蛋白含量测定试剂盒。
2. 最低检出限为 20 nmol/mL。