

血清封闭剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

在免疫组化染色中，如果组织内存在相同的内源酶，应抑制内源性酶活性，不能让其加入底物的反应体系，以免影响标记的效果，如过氧化物酶、碱性磷酸酶等。

血清封闭剂主要由优级牛血清、磷酸盐等组成，能够很好的非特异性结合反应，尤其适用于封闭冰冻切片的内源性酶的活性。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
血清封闭剂	50ml	1份	12个月	4℃

操作步骤（仅供参考）：

- 1、切片贴于玻片上，用 PBS 轻轻清洗。
- 2、将玻片吸干或吹干，入血清封闭剂，孵育 10~20min。
- 3、无需清洗，直接将玻片吸干或吹干。
- 4、在未标记的一抗中孵育。

注意事项：

- 1、一经开启，立即使用，并防止微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

载玻片核酸酶清洗试剂盒
过氧化物酶封闭液(H ₂ O ₂ 法)
通用强力抗原修复液(10×)
酸性磷酸酶封闭液(100×)
醋酸银显影液
钾矾明胶包被液