

吕氏碱性美蓝染色液(0.23%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

亚甲基蓝(Methylene blue)又称美蓝、次甲基蓝、次甲蓝等，含水亚甲基蓝的分子式为C₁₆H₂₄CIN₃O₃S，分子量为 373.9，CAS 号为 7220-79-3，活细胞具有新陈代谢作用，从而使活细胞内有较强的还原能力，能使美蓝从蓝色的氧化型变为无色的还原型，因此活细胞内的美蓝呈无色，死细胞或衰老的细胞还原能力极弱或消失，被美蓝染成蓝色或淡蓝色。

吕氏碱性美蓝染色液(0.23%)常用于酵母菌的染色，不但可以观察酵母菌的形态，还可以区分活细胞和死细胞，因其容易氧化，染色结果不宜长久保存。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
吕氏碱性美蓝染色液(0.23%)	500ml/100ml	RT	1 份	1 年

自备材料：

- 1、接种环或挑取细菌的其他工具。
- 2、载玻片、盖玻片
- 3、光学显微镜

操作步骤(仅供参考)：

- 1、取 1 滴吕氏碱性美蓝染色液(0.23%)于载玻片中央，用接种环取酵母菌与其混合均匀。
- 2、取 1 块盖玻片，将盖玻片一边与菌体接触，缓缓将盖玻片倾斜并覆盖在菌液上。
- 3、放置约 3min 后先用低倍镜后用高倍镜观察酵母的形态和出芽情况，并根据颜色区别死活细胞。
- 4、染色 30min 后可再次观察，注意活细胞的变化。

染色结果：

酵母菌活细胞	无色
--------	----

酵母菌死细胞

蓝色或淡蓝色

注意事项：

- 1、取酵母菌时，应注意无菌操作。
- 2、涂抹酵母菌于载玻片上时，动作应轻柔以免破坏细胞。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

蛋白甘油粘贴剂
草酸水溶液(2%)
草酸水溶液(1%)
苯酚水溶液(5%)
苯酚碱性品红溶液(5%0.5%)
半薄切片染色液(甲苯胺蓝法)