

# DNase I 溶液(1mg/ml)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

脱氧核糖核酸酶 I (DNase I) 是一种非特异性核酸酶切酶，大多数来源于重组 *E.coli* 菌株，含有牛胰腺 DNase I 的 MBP 融合克隆，DNase I 可用于降解单链或双链 DNA，其原理为 DNase I 水解磷酸二酯键产生带有 5'-磷酸基团和 3'-OH 的单核苷酸或寡核苷酸。

Mg<sup>2+</sup>或 Mn<sup>2+</sup>都可以激活 DNase I 的活性，而 Ca<sup>2+</sup>浓度直接影响酶的活性；Mg<sup>2+</sup>存在时可在双链 DNA 的每条单链上随机产生切口；而在 Mn<sup>2+</sup>存在下可使双链 DNA 断裂，使 DNA 片段化。

DNase I 溶液(1mg/ml)由 DNase I 、酶保护液、防腐剂等组成，浓度为 1mg/ml 相当于 2000U/ml，不含 RNase，用于单链 DNA、双链 DNA、染色质、RNA:DNA 杂交链，多用于无 DNA 污染的 RNA 的制备，逆转录及体外转录等实验。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

## 产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
DNase I 溶液(1mg/ml)	1ml/5ml	1 份	1 年	-20℃

**操作步骤(仅供参考):**

- 1、取 DNase I 溶液(1mg/ml)平衡至室温，低速离心，使液体沉至管底待用，根据不同实验，应加入适量的酶，以便充分消化 DNA，一般 1U 酶可消化小于 1 μg 的 DNA。
- 2、取 DNase I 溶液(1mg/ml)2~5 μl(即 4~10U)，加入待处理液(一般小于 4~10 μg)，最后用去离子水或 RNase-Free ddH<sub>2</sub>O 补至 100 μl。
- 3、 25~37°C 孵育 10min。
- 4、灭活条件：75°C 孵育 10min。

**注意事项:**

- 1、应注意避免污染和反复冻融。
- 2、1 单位是指在 50 μl 反应体系中，37°C 条件下，10min 能完全降解 1 μg 所需的酶量。