

U-937 人组织细胞淋巴瘤细胞

本产品仅供科研实验使用

基本信息

产品品牌 : 酶联生物

中文名称 : 人组织细胞淋巴瘤细胞

细胞简称 : U -937

细胞形态 : 单核细胞

生长特性 : 悬浮细胞

培养环境 : 空气 , 95% ; CO₂ , 5% 37°C

冻存条件 : 55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 液氮

完全培养基 : RPMI-1640(PM150110) + 10%FBS(164210-50) + 1%P/S(PB180120)

传代步骤

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养 , 离心转速参考 1200 rpm (250g 左右) , 离心 3 分钟

传代比例 (密度) : 3×10⁵-5×10⁵ cells/m L

换液频次 : 2~3 次/周

细胞背景描述

U -937 细胞是由 Sundstrom 和 Nilsson 于 1974 年建立 , 取材于患组织细胞淋巴瘤病人的胸水。研究表明 : U -937 细胞能被人混合淋巴细胞培养上清 , 佛波脂、维生素 D 3 、 γ 干扰素、肿瘤坏死因子和维甲酸诱导终末单核细胞分化。 U -937 细胞免疫球蛋白产物和 EB 病毒表达为阴性 ; U -937 细胞表达 Fas 抗原且对 TNF 和抗-Fas 抗体敏感。

倍增时间 : 30-60 hours

供体年龄 : 男

组织来源 : 组织细胞淋巴瘤

细胞类型 : 肿瘤细胞

肿瘤类型 : 淋巴瘤细胞

受体表达 : com plen ent(C 3)

基因表达 : lysozyme; beta-2-micro globulin (beta2 micro globulin); tumor necrosis factor(TNF), also known as tumor necrosis factor alpha(TNF-alpha, TNFalpha), after stimulation with phorbolmyristic acid (PMA)

生物安全等级 : 1

细胞保藏中心 : ATCC ; CRL-1593A TC C ; CRL-1593.2 DSMZ ; ACC-5ECACC ;

85011440

收到常温细胞后如何处理

细胞培养详细操作步骤请参照酶联生物细胞培养操作指南

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75% 酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片 将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养注意事项有疑问的，可跟我们的技术支持交流。

售前须知

该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集细胞悬液；请勿直接倒掉细胞培养液。

订购热线 : 4008-898-798

咨询 QQ : 2881505714

咨询电话 : 13524666836(微信同号)



www.mlbio.cn

