

兔肺动脉成纤维细胞

本产品仅供科研实验使用

产品简介

产品名称 : 兔肺动脉成纤维细胞

产品品牌 : 酶联生物

组织来源 : 肺动脉组织

产品规格 : 5×10^5 cells/T 25 细胞培养瓶

细胞简介

兔肺动脉成纤维细胞分离自肺动脉组织。肺动脉亦称肺动脉干。在呼吸空气的脊椎动物中，把静脉血由心脏导向肺脏的动脉。肺大动脉起于右心室，在主动脉之前向左上后方斜行，在主动脉弓下方分为左、右肺动脉，经肺门入肺。

肺动脉干位于心包内，为一粗短的动脉干。起自右心室，在升主动脉前方向左后上方斜行，至主动脉弓下方分为左、右肺动脉。

左肺动脉较短，在左主支气管前方横行，分二支进入左肺上、下叶。右肺动脉较长而粗，经升主动脉和上腔静脉后方向右横行，至右肺门处分三支进入右肺上、中、下叶。

成纤维细胞(Fibroblast) 是疏松结缔组织的主要细胞成分 ,由胚胎时期的间充质细胞分化而来。成纤维细胞较大 ,轮廓清楚 ,多为突起的纺锤形或星形的扁平状结构 ,其细胞核呈规则的卵圆形 ,核仁大而明显。

成纤维细胞功能活动旺盛 ,细胞质嗜弱碱性 ,具明显的蛋白质合成和分泌活动 ,在一定条件下 ,它可以实现跟纤维细胞的互相转化。成纤维细胞对不同程度的细胞变性、坏死和组织缺损的修复有着十分重要的作用。

刚分离的肺动脉成纤维细胞呈圆形、折光性良好 ,悬浮于培养基中。30min 细胞贴壁 ,其中部分开始伸出伪足 ,表现为小的突起。6h 后细胞基本贴壁完全 ,伸展成梭形 ,胞核清晰 ,分布较均匀 ,散在生长 ,不聚集成团。细胞生长迅速 ,5-7 天即呈融合状态 ,细胞排列紧密 ,有的交叉重叠生长 ,平坦、胞体较大 ,细胞质透明 ,细胞核较大 ,呈椭圆形 ,颜色淡。

细胞融合 ,并彼此连接成网状。细胞呈突起的纺锤形或星形的扁平分布。肺动脉成纤维细胞在生理条件下的主要功能包括 :构造和维持肺动脉的正常形态。合成和释放细胞外基质。组织损伤后及时大量聚集修复损伤组织。

方法简介

酶联生物实验室分离的兔肺动脉成纤维细胞采用胰蛋白酶-胶原酶混合消化法结合差速贴壁法制备而来 ,细胞总量约为 5×10^5 cells/瓶。

质量检测

酶联生物实验室分离的兔肺动脉成纤维细胞经 Vim entin 免疫荧光鉴定 ,纯度可达 90%以上 ,且不含有 H IV -1、H BV 、H C V 、支原体、细菌、酵母和真菌等。

培养信息

培 养 基 : 含 FBS、生长添加剂、Penicillin、Streptomycin 等

换液频率 : 每 2-3 天换液一次

生长特性 : 贴壁

细胞形态 : 成纤维细胞样

传代特性 : 可传 5 代左右。3 代以内状态最佳

传代比例 : 1:2

消 化 液 : 0. 25% 胰蛋白酶

培养条件 : 气相 : 空气 , 95% 。 C O₂ , 5%

兔肺动脉成纤维细胞体外培养周期有限。建议使用酶联生物配套的专用生长培养基及正确的

操作方法来培养，以此保证该细胞的最佳培养状态。

细胞培养状态

发货时发送细胞电子版照片

使用方法

兔肺动脉成纤维细胞是一种贴壁细胞，细胞形态呈成纤维细胞样，在酶联生物技术部标准操作流程下，细胞可传 5 代左右。3 代以内状态最佳。建议您收到细胞后尽快进行相关实验。

客户收到细胞后，请按照以下方法进行操作。

1. 取出 T 25 细胞培养瓶，用 75% 酒精消毒瓶身，拆下封口膜，放入 37°C、5% CO₂、饱和湿度的细胞培养箱中静置 3-4h，以稳定细胞状态。
2. 贴壁细胞消化
 - 1) 吸出 T25 细胞培养瓶中的培养基，用 PBS 清洗细胞一次。
 - 2) 添加 0.25% 胰蛋白酶消化液 1mL 至 T 25 培养瓶中，轻微转动培养瓶至消化液覆盖整个培养瓶底后，吸出多余胰蛋白酶消化液，37°C温浴 1-3min。倒置显微镜下观察，待细胞回缩变圆后，再加入 5mL 完全培养基终止消化。
 - 3) 用吸管轻轻吹打混匀，按传代比例接种 T25 培养瓶传代，然后补充新鲜的完全培养基至 5mL，置于 37°C、5% CO₂、饱和湿度的细胞培养箱中静置培养。
 - 4) 待细胞完全贴壁后，培养观察。之后按照换液频率更换新鲜的完全培养基。

3. 细胞实验

因原代细胞贴壁特殊性，贴壁的原代细胞在消化后转移至其他实验器皿（如玻璃爬片、培养板、共聚焦培养皿等）时，需要对实验器皿进行包被，以增强细胞贴壁性，避免细胞因没贴好影响实验。包被条件常选用鼠尾胶原 I (2-5μg/cm²)，多聚赖氨酸 PLL (0.1mg/mL)，明胶 (0.1%)，依据细胞种类而定。悬浮/半悬浮细胞无需包被。

注意事项

1. 培养基于 4°C 条件下可保存 3-6 个月。
2. 在细胞培养过程中，请注意保持无菌操作。

3. 传代培养过程中，胰酶消化时间不宜过长，否则会影响细胞贴壁及其生长状态。
4. 建议客户收到细胞后前 3 天每个倍数各拍几张细胞照片，记录细胞状态，便于和酶联生物技术部沟通。由于运输的原因，个别敏感细胞会出现不稳定的情况，请及时和我们联系，详尽告知细胞的具体情况，以便我们的技术人员跟踪、回访直至问题得到解决。

订购热线 : 4008-898-798

咨询 QQ : 2881505714

咨询电话 : 13524666836(微信同号)

