

HePa1-6-LUC

基本信息

细胞名称	HePa1-6-LUC
细胞品牌	酶联生物
细胞编号	ml-CC2097
细胞英文	HEPA1-6+luc 细胞
细胞规格	1*10 ⁶
细胞冻存	液氮冻存
干冰运输	2ml 冻存管
活细胞运输	T25 瓶
培养基	(1.5g/L NaHCO ₃)+10%FBS+1%双抗
细胞生长状态	贴壁
荧光标签	无荧光
筛选抗性	puro
保存培养温度(°C)	37°C
供应范围	仅限于科研实验使用, 不可作为其它用途
存接收后处理	干冰运输, 收到细胞后立即转入-80°C冰箱短暂中转或直接复苏
	收到细胞后,发现干冰已经完全挥发、冻存管瓶盖破裂脱落,请立即拍照与我们联系

复苏接收后处理	收到细胞后, 请首先检查培养瓶是否破损	如有漏液及培养液混浊情况请立即拍
	或漏液, 培养液是否混浊	照把图片发给我们
	75%酒精消毒瓶身后放培养箱中静置	若有贴壁细胞脱落, 可收集上清离心,
	4-6h 后, 在显微镜下确认细胞状态并拍	将沉淀用新的培养基接种至新的培养
	照 100 倍和 200 倍的照片	瓶或培养皿中。
	建议收到当天不要消化处理, 如果细胞长满 90%, 可选择传代处理	
	您收到细胞 3 天内没有反馈相关问题, 出现的细胞问题将不提供免费重发服务	

细胞培养操作及注意事项

1、细胞传代: 细胞密度达到 80-90%时即可传代

① 弃去培养上清, 用 PBS 或生理盐水清洗 1-2 次。

② 加入 2ml0.25%胰酶 (T25 瓶), 使胰酶覆盖整个瓶或皿, 盖好放入培养箱消化。

③ 1-2min 后, 显微镜下观察细胞, 若大部分细胞回缩且有少量细胞脱落, 轻轻吹打下确认消化情况后加入完全培养基终止消化; 若细胞还是贴壁, 放回培养箱继续消化至可以轻轻吹打下为止。

④ 将细胞悬液 1000RPM 左右条件下离心 4min, 弃上清。

⑤ 用新鲜培养基重悬后加入培养瓶或皿中, T25 培养瓶加 6-8ml 培养基。

⑥ 悬浮细胞直接离心收集, 细胞沉淀重悬后分到新培养瓶中。

2、细胞复苏

① 将冻存管在 37℃温水中快速摇晃融化, 时间 1min 左右, 加入 4-5ml 培养基混匀。

② 在 1000RPM 左右条件下离心 4min, 弃上清, 加 1-2ml 培养基吹匀, 将细胞悬液加入培养瓶中, 补加适量培养基。

3、细胞冻存：待细胞生长状态良好时进行细胞冻存保种

① 弃去培养上清，用 PBS 或生理盐水清洗 1-2 次，加入 1mL 0.25%胰蛋白酶（T25 瓶）。

② 1-2min 后，显微镜下观察细胞，大部分细胞回缩且有少量细胞脱落，轻轻吹打下确认消化情况后加入完全培养基终止消化。

③ 将细胞悬液 1000RPM 左右条件下离心 4min，弃上清，加 1ml 冻存液重悬细胞。

④ 将冻存管放入程序降温盒，放入 -80℃ 冰箱，4 小时后将冻存管转入液氮罐储存。

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。

细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。

4. 细胞状态不好, 未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片, 不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的, 不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的, 不重发。

特别说明

客户买细胞就找上海酶联生物, 稳定传代, 无污染, 包存活, 提供整体课题外包服务, 光学成像, 流式实验, 电镜实验, 动物实验, 病理实验, 分子生物学实验, 细胞实验等, 严格把控产品质量, 所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查, 为科研人员提供可靠放心的产品。